

Dente per dente

Piccolo vademecum per bambini allo sbaraglio



Solitamente a partire dallo svezzamento, la natura viene incontro ai nostri piccoli stimolando l'eruzione dei denti da latte.

A intervalli di circa 6 mesi l'uno dall'altro, i denti da latte, a gruppi, cominciano a farsi breccia tra le gengive dei nostri piccoli, creando non pochi problemi.

Ecco i 3 passi per uscirne incolumi!

1

PREVENZIONE

Tutto ciò che si può fare per prevenire i principali fastidi

2

LA FASE ACUTA

Omeopatia e farmacologia tradizionale a braccetto

3

L'URGENZA

Quando si supera il limite (rari casi per fortuna)

Lo sapevi?



Acci-denti!!

Durante l'eruzione dei denti da latte spesso le feci dei piccoli sono liquide, scure e acide, ricche di muco con conseguente irritazione della pelle del sederino.



Ma che dolce museruola

Intorno alla bocca possono formarsi tanti piccoli punti rossi, segni di una dermatite dovuta all'abbondante salivazione che si ha alla nascita dei dentini

1

Da quando il piccolo inizia ad avere la tendenza a mettere tutto in bocca e a sbavare un pochino di più (**circa verso i 4 mesi**) si può stimolare l'ispessimento gengivale con degli spazzolini specifici in gomma (liscia o zigrinata) muniti di blocco per impedire l'ingestione. Possono essere anche messi in frigorifero per rinfrescare la bocca -

Ai primi arrossamenti della gengiva procedere con una terapia omeopatica

Chamodent globuli Locker: 5-7 globuli 3 volte al giorno lontano dai pasti, sciogliere in un cucchiaino di acqua o direttamente in bocca come caramelline

Chamodent Baby Gel Locker : applicare una piccola quantità di prodotto sul dito e massaggiare delicatamente la gengiva, 4 -5 volte al giorno lontano dai pasti. Conservare in frigorifero

2**All'aumento dei sintomi associare la terapia omeopatica a quella farmacologica classica:**

Chamodent globuli Locker: 5-7 globuli ogni 15 minuti fino all'attenuarsi dei sintomi

Chamodent Baby Gel Locker o Balsamo primi denti gel gengivale : applicare una piccola quantità di prodotto sul dito e massaggiare delicatamente la gengiva

Viburcol supposte omeopatiche: 1 supposta più volte die in fase acuta, dopo miglioramento 1 supposta 2-3 volte die nei neonati sino a sei mesi 1\2 supposta con identica posologia. Viburcol, può essere assunto anche in associazione ad altri prodotti e farmaci per aumentarne l'effetto e la durata

Paracetamolo: in supposte o sciroppo in dosi regolate in base all'età

3**In caso di dolore importante e febbre alta:**

Contattare il pediatra di famiglia per eventuale terapia della fase acuta con ibuprofene pediatrico e/o paracetamolo

Attendarsi ad una dieta leggera ricca di cibi freschi e acqua. Attenzione ai succhi di frutta: il loro pH acido può irritare ulteriormente le gengive invece di dare sollievo!